



## CENTRO MEDICO TEKNON

Dra. Maite Palá Calvo, Pediatra, n. col. 29355  
Consultorios Marquesa, cons. 9, 08019 Barcelona  
Telf 93-2906409

[www.palapediatra.com](http://www.palapediatra.com)

### VACUNA MENINGOCOCO B, hoja informativa.

Fuente: [vacunasaeped.org](http://vacunasaeped.org) (Asociación Española de Pediatría).

El meningococo es una bacteria, causante de infecciones poco frecuentes pero muy graves, como meningitis y sepsis (infección de la sangre), que pueden dejar secuelas importantes e incluso conducir a la muerte en aproximadamente 1 de cada 10 casos. El meningococo vive durante temporadas en la nariz y la garganta de adolescentes y jóvenes sanos, sin producir daño; son los portadores asintomáticos. Aunque este germen puede infectar a personas de cualquier edad, los casos son más frecuentes en niños pequeños y adolescentes.

Hay varias familias de meningococos. En España actualmente el principal causante de enfermedad meningocócica es el del grupo B.

Otro que era habitual es el meningococo C, que está controlado gracias a la vacunación.

Afortunadamente estamos atravesando unos años con baja incidencia de enfermedad meningocócica en nuestro país. La Asociación Española de Pediatría recomienda la vacunación frente al meningococo B para todos los niños a partir de los 2 meses de edad.

La vacuna disponible actualmente frente al meningococo B, se llama BEXSERO, se inyecta por vía intramuscular. El número de dosis a administrar depende de la edad a la que se inicia la vacunación:

Población	Inmunización primaria - Núm. de dosis	Intervalos mínimos entre dosis primarias	Dosis de refuerzo	Núm. TOTAL de dosis
Lactantes de 2 a 5 meses	3	1 mes	Sí, 1 dosis entre los 12 y 15 meses de edad	4
Lactantes no vacunados de 6 a 11 meses	2	2 meses	Sí, 1 dosis en el 2.º año de vida con un intervalo de, al menos, 2 meses entre la dosis final de primovacuna y la dosis de refuerzo	3
Lactantes no vacunados de 12 a 23 meses	2	2 meses	Sí, 1 dosis con un intervalo de 12 a 23 meses entre la dosis final de primovacuna y la dosis de refuerzo	3
Niños de 2 a 10 años	2	2 meses	No	2
Adolescentes desde 11 años de edad y adultos	2	1 mes	No	2

Barcelona, 30 de octubre de 2017

Dra. M. PALÁ CALVO  
PEDIATRA  
Nº Col. 29.355